

LE MARTINET - CHAMPIGNONS

Amanite citrine	Très commune. Elle apparaît précocement sous les arbres. De couleur jaune citron.	Il est préférable de la considérer comme toxique.	<i>Amanita citrina</i>
Amanite citrine variété blanche	Identique à la précédente, mais blanche.	Voir ci-dessus.	<i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i>
Amanite rougissante Colmoitte	Très commune et très précoce. On la trouve sur tous terrains et dans les sous bois.	Excellent comestible cuit. Toxique crue.	<i>Amanita rubescens</i>
Amanite aux nouches Fausse orange	Très courante et très populaire. Espèce des sous bois de feuillus (et de résineux). Sous feuillus : préférence pour le bouleau.	Non comestible. Provoque des hallucinations.	<i>Amanita muscaria</i>
Amanite vaginée variété grise	Assez précoce dans les bois de feuillus.	Excellent comestible cuit. Toxique crue.	<i>Amanita vaginata</i> var. <i>grisea</i>
Bolet à chair jaune	Commun dans les bois de feuillus (et de résineux).	Comestible.	<i>Xerocomus chrysenteron</i>
Bolet rougeâtre	Lieux boisés, herboux, lisières, etc...	Comestible.	<i>Xerocomus rubellus</i>
Calvatia en coupe Vesse-de-loup en vase	Bois aérés et lisières.	Non comestible.	<i>Calvatia excipuliformis</i>
Gèpe de Bordeaux	Commun dans les parties assez claires des bois et des lisières.	Excellent comestible.	<i>Boletus edulis</i>
Clitocybe bicolore	Petite espèce tardive, très commune dans les bois de feuillus.	Non comestible.	<i>Clitocybe decembris</i>

Clitocybe en entonnoir	Espèce très commune et abondante dès le début de l'été Bois de (résineux) et de feuillus.	Comestible. Peu savoureux.	<i>Clitocybe gibba</i>
Clitocybe nébuleux	Espèce robuste, tardive, en automne jusqu'aux gelées. Commune dans les bois de feuillus.	Comestible.	<i>Clitocybe nebularis.</i>
Collybie beurrée	Parmi les plus communs dans les bois de feuillus.	Non comestible.	<i>Collybia butyracea</i>
Collybie des arbres Collybie du chêne	Très commun. Non exclusif des chênes. En troupes du printemps à l'automne.	Non comestible.	<i>Collybia dryophila</i>
Collybie guêtrée	Espèce très commune dans les bois de feuillus (et mêlés), en milieu plutôt sec. Pousse sur feuilles sèches.	Non comestible.	<i>Collybia peronata</i>
Collybie radicante	Très courant sous feuillus (surtout de hêtre). **	Non comestible.	<i>Oudemansiella radicata</i>
Collybie veloutée	Espèce hivernale (de novembre à février ou mars). En touffes sur bois vivant ou mort de feuillus, souches ou bois enfoui.	Comestible.	<i>Flamulina velutipes</i>
Coprin chevelu	e.a. décharges, abord des chemins...	Excellent comestible.	<i>Coprinus comatus</i>
Coprin disséminé	En troupes de plusieurs centaines, (sur sol riche en humus) ou sur souches pourrissantes.	Non comestible.	<i>Coprinus disseminatus</i>
Coprin noir d'encre	En touffes très denses sur débris ligneux. En été et automne.	Comestible si l'on s'abstient de toute boisson alcoolisée avant, pendant et jusque 48H. après le repas. Provoque des effets semblables à l'amaïbuse.	<i>Coprinus atramentarius</i>

Coprin pile	Assez commun. Isolé ou en petits groupes, sur le sol humifère des bois de feuillus.	Non comestible.	<i>Coprinus picaceus</i>
Crépidote variable	Espèce très répandue, sur branches et brindilles mortes et sèches.	Non comestible.	<i>Crepidotus variabilis</i>
Exidia glanduleuse	Sur rameaux morts de feuillus. Pratiquement toute l'année.	Non comestible.	<i>Exidia glandulosa</i>
Ganoderme aplani	Parasite de feuillus divers, à la base des troncs vivants.	Non comestible.	<i>Ganoderma applanatum</i> = <i>G. lipsiense</i>
Géastre hygrométrique	Commune en lieux secs et chauds. (Effrills).	Non comestible.	<i>Astreus hygrometricus</i>
Helvelle crêpe	Commune en fin d'été et en automne en lisières herbues, clairières, haies. Sous feuillus.	Bon comestible.	
Hygrophore conique	Assez commun dans (l'herbe des prés), bords de chemins. Du printemps à l'automne.	Assez toxique.	<i>Hygrocybe conica</i>
Hygrophore conique	Assez commun en groupe dans (l'herbe des prés), les graminées, les lisières, etc...	Assez toxique.	<i>Hygrocybe conica</i>
Hyménochaète couleur de tabac	Très commun toute l'année sur divers feuillus.	Non comestible.	<i>Hymenochaete tabacina</i>
Hypholome en touffes	Espèce très commune toute l'année, en touffes sur toutes sortes de bois.	Toxique.	<i>Hypholoma fasciculare</i>
Inocybe à lames terreuses	Espèce très commune sur le sol et dans l'herbe des bois feuillus. **	Assez toxique.	<i>Inocybe geophylla</i>
Inocybe fastigié	Le plus commun des inocybes. Bois de feuillus (et de résineux), parcs.	Mortel.	<i>Inocybe rimosa</i>
Irpex paradoxo	Très commun sur bois mort surtout. de feuillus qu'il couvre de larges croûtes blanches.	Non comestible.	<i>Schizopora paradoxa</i>

Laccaria amethyste	Particulièrement en forêt de feuillus, abondant par pieds dispersés dans la mousse ou la litière.	Bon comestible.	<i>Laccaria amethystina</i>
Laccaria laqué	Commun dans les bois, les lisières, ...	Bon comestible.	<i>Laccaria laccata</i>
Lactaire à toison	Sous feuillus, essentiellement bouleaux.	Assez toxique.	<i>Lactarius torminosus</i>
Lactaire roux	(Sous résineux), plus rarement sous bouleaux **	Non comestible.	<i>Lactarius rufus</i>
Lépiote crêpée	Espèce assez commune. Dans l'herbe des bois clairs, (des parcs, des jardins.	Assez toxique.	<i>Lepiota cristata</i>
Lycogale des arbres	Très fréquent sur souches, troncs abattus de feuillus (et de résineux)	Non comestible.	<i>Lycogala epidendrum</i>
Marasme des rameaux	En troupes sur brindilles.	Non comestible.	<i>Marasmiellus ramealis</i>
Mycène en casque	En troupes souvent importantes sur souches diverses	Non comestible.	<i>Mycena galericulata</i>
Mycène incliné	Très commun sur troncs de feuillus et souches pourries.	Non comestible.	<i>Mycena inclinata</i>
Mycène iodé	En troupes sur litière de feuillus	Non comestible.	<i>Mycena metata</i>
Mycène pur	Abondant (isolé ou en petites troupes sur litière des forêts de feuillus	Assez toxique.	<i>Mycena pura</i>
Mycène pur forme blanche	Id. ci-dessus.	Id. ci-dessus.	<i>Mycena pura f. alba</i>
Omphale bibelot	Très fréquente mais cachée parmi les coussins de mousses des forêts.	Non comestible.	<i>Rickenella fibula</i>
Paxille enroulé	Espèce très commune. Liée aux bouleaux	Toxique.	<i>Paxillus involutus</i>
Pholiotte changeante	En touffes parfois importantes sur feuillus divers.	Très bon comestible.	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>
Pied bleu	Espèce violacée. Bois de feuillus (et de résineux, parcs, jardins), parfois isolés ou en groupes.	Bon comestible.	<i>Lepista nuda</i>

Pleurote en huître	Assez fréquent sur souches de feuillus.	Très bon comestible	<i>Pleurotus ostreatus</i>
Polypore du bouleau	Uniquement sur bouleau où il persiste toute l'année	Non comestible	<i>Piptoporeus betulinus</i>
Polypore brûlé	Commun sur bois vivant ou mort de feuillus	Non comestible	<i>Bjerkandera adusta</i>
Polypore écailleux	Sur tronc ou branche de feuillus.	Non comestible	<i>Polyporus squamosus</i>
Polypore variable	Sur bois mort de feuillus divers.	Non comestible	<i>Polyporus leptcephalus</i>
Psathyrelle grisâtre	En touffes parfois énormes sur souches. Pas très commun.	Non comestible	<i>Psathyrella multipedata</i>
Psathyrelle grisâtre	Sur terre nue pou débris divers, en sous-bois, lisières herbeuses	Non comestible	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i>
Psathyrelle hydrophile	Caractéristiques id. à P. grisâtre. Grisâtre.	Non comestible	<i>Psathyrella piluliformis</i>
Russule charbonnière	Sur sols variés, mais surtout sous feuillus (mais aussi sous résineux).	Bon comestible.	<i>Russula cyanoxantha</i>
Russule grise	Commune sous bouleau en stations humides.	Non comestible	<i>Russula grisea</i>
Russule jaunissante	Assez commune dans les bois de feuillus : bouleaux, aulnes, (et de résineux).	Non comestible	<i>Russula puellaris</i>
Russule ocre et blanc	Très commune partout dans les bois de feuillus (et de résineux).	Non comestible	<i>Russula ochroleuca</i>
Schizophylle commune	Espèce très répandue sur toutes sortes de bois et brindilles.	Non comestible	<i>Schizophyllum commune</i>
Scléroderme commun	Très commun dans les bois de feuillus (et de résineux) dans les lieux humides, les mousses, etc...	Assez toxique.	<i>Scleroderma citrinum</i>
Stérée hirsute	Très commun sur toutes sortes de bois, surtout de feuillus.	Non comestible	<i>Stereum hirsutum</i>
Téléphore terrestre	Espèce très commune au sol où elle enrobe les débris végétaux ou adhérant aux brindilles, tronc, etc...	Non comestible	<i>Telephora terrestris</i>
Tramète hirsute	Commun sur bois de feuillus.	Non comestible.	<i>Trametes velutina</i>
Tramète rougissant	Fréquent sur les arbres des bords des eaux et les lieux frais.	Non comestible.	<i>Daedaleopsis confragosa</i>

<i>Tramete versicolore</i>	Très commun sur souches et bois morts de feuillus (et de résineux).	Non comestible	<i>Trametes versicolore</i>
<i>Tremella mesenterica</i>	Commune sur souches, branches de feuillus.	Non comestible	<i>Tremella mesenterica</i>
<i>Tricholome brûlé</i>	Assez fréquent dans les bois de feuillus humides (parfois sous conifères).	Non comestible	<i>Tricholoma ustale</i>
<i>Tricholome vergeté</i>	Assez fréquent dans les bois mêlés.	Non comestible	<i>Tricholoma virgatum</i>
<i>Vesse - de - loup perlée</i>	Sur humus forestier ou sur bois pourrissant. En troupes.	Non comestible	<i>Lycoperdon perlatum</i>
<i>Vesse-de-loup en forme de poire</i>	Sous-feuillus, en colonie sur vieilles souches ou bois pourrissant. **	Non comestible	<i>Lycoperdon pyriforme</i>
<i>Volvaire visqueuse</i>	Commun sur prairies fumées, détritiques, etc... **	Bon comestible	<i>Volvariella gloiocephala</i>
<i>Xylaire du bois</i>	Très commun sur bois mort peu attaqué. Bois de feuillus, parcs, jardins, etc...	Non comestible	<i>Xylaria hypoxylon</i>

Ouvrages consultés

Guide des champignons de France et d'Europe – R. Courtecuisse - B. Duheim – Ed. Delachaux et Niestlé (1994).
 Champignons d'Europe occidentale – Marcel Bon – Ed. Arthaud (1988).
 Nouveau guide des champignons – Cécile Lemoine – Ed. Ouest-France (1996). (Pour grand public).